

KEDİ GENÇLİK HASTALIĞI KEDİ PANLÖKOPENİ ENFEKSİYONU FELINE PANLEKOPENIA (FPV)

KISA BİLGİ NOTU

Hastalığın etkeni parvovirüs ailesinden Feline Panleukopenia Virustur (FPV).

Evcil ve vahşi kedigillerde hastalığa neden olur. Tüm yaş gruplarında görülmekle birlikte 4 aylık yaşa kadar olanlarda ölümcül iken erişkinlerde hafif seyirlidir.

En önemli bulaşma kaynağı dışkı olup diğer tüm vücut salgılarıyla virüs etrafa yayılır. Virüsle bulaşmış mama, su kapları kediler arasında yayılmada oldukça önemlidir. Pire ve diğer böcekler vasıtasıyla da bulaşabilir.

Oldukça dayanıklı bir virüs olup ağız ve burun yoluyla alınır. Bölgesel lenf yumrularında çoğalarak kana geçer ve tüm vücuda yayılır.

Yüksek ateş, su kaybı, iştahsızlık, kusma, ishal, kanlı ishal, tüylerde dağınıklık, ağız içinde yara, kansızlık, depresyon, koordinasyon eksikliği şeklinde nörolojik belirtiler, karında şiddetli ağrı, kansızlık, ileri derecede akyuvar azalması hastalığın teşhisinde dikkate alınır. Hastalığın perakut seyretmesi durumunda bir gün içerisinde ölüm görülebilir.

Hamile kedilerde yavrunun mumifiye olması, düşük şekillenmesi, canlı doğarlarda ise beyin hasarı görülebilir.

Özellikle yetişkin kedilerde çok hafif bulgular göstererek birkaç gün içerisinde iyileşme ile sonlanabilir.

Enfeksiyona karşı korunmanın en güvenilir yolu aşılamaadır. Annesi aşıllı olan ve kolostrum (ağız sütü) almış yavrular 6-8 haftalıkken aşılanır. 3-4 hafta sonra rapel aşı uygulanır.

Annesi aşıllı olmayan veya kolostrum (ağız sütü) almamış yavrulara ise ilk aşı 4 haftalıkken uygulanır, 3-4 hafta sonra da rapel aşı uygulaması yapılır.

Korunmada kedi kulübelerin temizlik ve dezenfeksiyonuna özen gösterilmeli, hijyene kurallarına hassasiyetle uyulmalıdır.